УДК 519.1

А. М. Магомедов

Двудольные $(6, 3)_6$ -бирегулярные графы, не допускающие интервальной раскраски

Предложенный в статье алгоритм элиминации перебора свел задачу поиска нераскрашиваемого графа к построению дерева из 11645 узлов, из которых 2485 узлов – последнего уровня; узловые графы последнего уровня образуют искомое множество $(6, 3)_6$ -графов M_0 . Программа обнаружила среди них точно 62 нераскрашиваемых графа, а для $n \leq 5$ выяснила раскрашиваемость всех графов из множеств – аналогов M_0 для рассматриваемых n . Тем самым получено уточнение наименьшего n , для которого существует нераскрашиваемый $(6, 3)_n$ -граф.

Библиография: 4 названия.

The proposed in the article search elimination algorithm reduces the problem of finding of a non-colorable graph to building the tree of 11645 nodes, 2485 of which are last level nodes; nodal graphs of the last level form the desired set M_0 of $(6, 3)_6$ -graphs. The program found among them just 62 non-colorable graphs, and for $n \leq 5$ it constructed colorings for all graphs from the sets – analogues of M_0 for considered n . Thus specification of minimal n , for which the non-colorable $(6, 3)_n$ -graph exists was obtained.

Bibliography: 4 items.

Ключевые слова: двудольный граф, интервальная реберная раскраска, теория расписаний.

Keywords: bipartite graph, interval edge coloring, job shop scheduling.

Введение

В статье использованы обозначения и определения из книги [1]. *Интервальной* (реберной) *раскраской графа t цветами* будем называть отображение множества ребер графа в множество $\{1, 2, \dots, t\}$, такое, что: 1) для каждого i , $1 \leq i \leq t$, найдется ребро, закрашенное в цвет i , 2) в каждой вершине графа все представленные в ней цвета попарно различны и образуют целочисленный интервал.

В [2] доказана NP -полнота задачи об интервальной (реберной) раскрашиваемости 6 цветами двудольного графа $G = (X, Y, E)$, где степени всех вершин X равны 6, а степени всех вершин Y равны 3. Такие графы будем называть $(6, 3)$ -бирегулярными или, более кратко, $(6, 3)$ -графами; $(6, 3)$ -граф $G = (X, Y, E)$, где $|X| = n$ (тогда $|Y| = 2n$), будем называть $(6, 3)_n$ -графом. $(6, 3)$ -граф будем называть (не)раскрашиваемым, если он (не) допускает интервальной раскраски 6 цветами.

Из результата [2], в частности, следует существование нераскрашиваемых $(6, 3)_n$ -графов. Приведенное в [2] принципиальное решение проблемы в настоящей статье дополнено уточнением наименьшего n , для которого существует нераскрашиваемый $(6, 3)_n$ -граф. Более точно, доказана следующая теорема.

ТЕОРЕМА 1. *Для любого $n \geq 6$ найдется нераскрашиваемый $(6, 3)_n$ -граф. При $n \leq 5$ каждый $(6, 3)_n$ -граф раскрашиваем.*

1. Интервальная и гармоническая раскраски

Отображение множества ребер E $(6, 3)$ -графа $G = (X, Y, E)$ в множество из двух цветов, такое, что в каждой вершине $y \in Y$ все три инцидентных y ребра имеют одинаковые цвета, а каждой вершине $x \in X$ инцидентны по три ребра каждого из двух цветов, будем называть *гармонической раскраской графа G* .

Следующая лемма независимо (и в различных терминах) доказана в [2] и [3].

ЛЕММА 1. *Для раскрашиваемости $(6, 3)$ -графа G необходимо и достаточно существование гармонической раскраски графа G .*

Простое арифметическое упражнение с применением системы компьютерной математики Mathematica 8.0 показывает, что метод полного перебора для проверки существования $(6, 3)_n$ -графа, не допускающего гармонической раскраски, бесперспективен даже при $n = 6$. В самом деле, при $n = 6$ полный перебор всех $(6, 3)_n$ -графов, когда для каждой из шести вершин $x \in X$ в списки смежности x независимо выбираются шесть вершин из Y , потребует рассмотрения громоздкого числа вариантов – C_{12}^6 в шестой степени (через C_{12}^6 обозначено сочетание из 12 по 6). Каждый способ выбора необходимо дополнить проверкой, является ли полученный граф $(6, 3)_n$ -графом, а в случае положительного результата – также и проверкой существования гармонической раскраски, что в худшем случае потребует рассмотрения для каждого графа C_{12}^6 случаев. Для компьютера, способного рассмотреть 1 млрд случаев в секунду, для вычислений может понадобиться

$$(C_{12}^6)^7 / (1000000000 \cdot 3600 \cdot 24 \cdot 365) \approx 18235 \text{ лет.}$$

2. Нераскрашиваемые $(6, 3)_n$ -графы

2.1. Граф G_0 , $(6, 3)$ -надграф которого не допускает гармонической раскраски. Всюду в дальнейшем выберем значения цветов в определении гармонической раскраски равными $+1$ и -1 .

ЗАМЕЧАНИЕ 1. Тогда при любой гармонической раскраске: 1) для любой вершины $x \in X$ сумма цветов ребер, инцидентных x , равна нулю (*свойство гармоничности для вершины x*); 2) следовательно, сумма цветов всех ребер графа также равна нулю.

Обозначим через $G_0 = (X_0, Y_0, E_0)$ двудольный граф, где $X_0 = \{x_1, x_2, x_3\}$, $Y_0 = \{y_1, \dots, y_{12}\}$, а множество ребер E_0 задано списками смежности вершин множества X_0 : $x_1(y_1, y_2, y_3, y_4, y_5, y_6)$, $x_2(y_1, y_2, y_3, y_7, y_8, y_9)$, $x_3(y_1, y_2, y_3, y_{10}, y_{11}, y_{12})$ (рис.1а).

а) двудольный граф
 $G_0 = (X_0, Y_0, E_0)$;

б) двудольный граф
 $G_1 = (X_1, Y_1, E_1)$,
пример 6-дополнения

Рис. 1.

ЛЕММА 2. Если $(6, 3)$ -граф $G = (X, Y, E)$ является надграфом для G_0 , то G не допускает гармонической раскраски.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Допустим противное: пусть существует некоторая гармоническая раскраска с графа G . Цвета ребер, инцидентных вершине $y_i \in Y$, будем обозначать через c_i , $1 \leq i \leq 12$. Выполнив почленное сложение равенств, выражающих свойство гармоничности для вершин x_1, x_2 и x_3 соответственно:

$$c_1 + c_2 + c_3 + c_4 + c_5 + c_6 = 0,$$

$$c_1 + c_2 + c_3 + c_7 + c_8 + c_9 = 0,$$

$$c_1 + c_2 + c_3 + c_{10} + c_{11} + c_{12} = 0,$$

получим: $(c_1 + \dots + c_{12}) + 2(c_1 + c_2 + c_3) = 0$.

Так как, согласно замечанию 1, $c_1 + \dots + c_{12} = 0$, то отсюда: $c_1 + c_2 + c_3 = 0$, что невозможно ввиду принадлежности c_1, c_2, c_3 множеству $\{-1, +1\}$. Полученное противоречие доказывает, что гармоническая раскраска графа G не существует. Лемма доказана.

2.2. Теорема о нераскрашиваемых $(6, 3)$ -графах. Пусть задано натуральное n , $n \geq 6$. Любой двудольный граф $G_1 = (X_1, Y_1, E_1)$, где $X_1 = \{x_4, x_5, \dots, x_n\}$, $Y_1 = \{y_4, y_5, \dots, y_{2n}\}$,

$$d(y_4) = \dots = d(y_{12}) = 2, d(y_{13}) = \dots = d(y_{2n}) = 3, d(x_4) = \dots = d(x_n) = 6, \quad (2.1)$$

будем называть *дополнительным графом* (или n -*дополнением*) для G_0 .

В описанном ниже алгоритме построения дополнительного графа *текущие значения* степеней вершин v обозначены через $D(v)$, разности $d(v) - D(v)$ названы *дефицитами* вершин v , а вершины с дефицитами, (не)равными нулю, названы *(не)насыщенными*.

Алгоритм построения дополнительного графа

Вход: граф $G_0 = (X_0, Y_0, E_0)$, натуральное $n, n \geq 6$, списки $d(y_4), \dots, d(y_{2n})$ и $d(x_4), \dots, d(x_n)$ со значениями элементов, заданными в (2.1); элементы списков приобретут смысл степеней соответствующих вершин лишь после завершения алгоритма.

Выход: n -дополнение для G_0 .

1. **Инициализация:** $X_1 := \{x_4, x_5, \dots, x_n\}$; $Y_1 := \{y_4, y_5, \dots, y_{2n}\}$; $D(v) := 0$ для всех $v \in X_1 \cup Y_1$;

{Легко видеть, что после инициализации

- 1) *сумма дефицитов вершин каждого из множеств X_1 и Y_1 равна $6n - 18$;*
- 2) *разность любых двух элементов следующего списка:*

$$d(y_4) - D(y_4), \dots, d(y_{2n}) - D(y_{2n}) \quad (2.2)$$

равна -1, 0 или 1 («свойство близости элементов списка»)

1. **Цикл:** **пока** в множестве X_1 имеется ненасыщенная вершина x , соединить x рёбрами с каждой из шести вершин множества Y_1 , имеющих наибольшие значения дефицитов

{проведение ребра сопровождается увеличением текущих степеней его концевых вершин}

Конец алгоритма.

ЛЕММА 3. Для любого заданного натурального n , $n \geq 6$, алгоритм построения дополнительного графа генерирует n -дополнение $G_1 = (X_1, Y_1, E_1)$ для графа G_0 .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Выполнение каждой итерации цикла уменьшает на единицу шесть наибольших элементов списка (2.2), что, очевидно, сохраняет свойство близости элементов списка. Отсюда следует, что пока дефицит хотя бы одной вершины множества Y_1 превышает 1, дефицит любой из вершин Y_1 не меньше 1.

Рис. 2. Нераскрашиваемый $(6,3)_6$ -граф G

Последнее, ввиду очевидных соотношений: $|Y_1| = 2n - 3$ и $2n - 3 \geq 6$, обеспечивает возможность насыщения очередной выбранной вершины $x \in X_1$.

Обозначим через k наименьший номер итерации, после выполнения которой дефицит каждой вершины множества Y_1 равен 0 или 1. Тогда количество вершин Y_1 , имеющих дефицит 1, равно, как легко видеть, $6(n - 3) - 6k$, а количество ненасыщенных вершин (с дефицитом 6 каждая) в множестве X_1 составляет $(n - 3) - 3$. Выполнимость заключительных $(n - 3) - k$ итераций цикла очевидна: каждая из них заключается в соединении ненасыщенной вершины множества X_1 с шестью вершинами множества Y_1 , дефициты которых равны 1. Лемма доказана.

ЗАМЕЧАНИЕ 2. Если частное и остаток от целочисленного деления $2n - 12$ на 6 обозначить через p и q соответственно, то можно показать, что наименьший номер итерации k , после которой дефициты вершин Y_1 не превышают 1, равен $2p + 2$ (при $q = 0$) или $2p + 1$ (при $q \neq 0$).

ТЕОРЕМА 2. Для любого $n \geq 6$ существует $(6,3)_n$ -граф $G = (X, Y, E)$, не допускающий гармонической раскраски.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. В качестве графа G можно взять объединение G_0 и его n -дополнения G_1 . Теорема доказана.

СЛЕДСТВИЕ 1. Для любого $n \geq 6$ существует нераскрашиваемый $(6, 3)_n$ -граф $G = (X, Y, E)$.

На рис.2 приведен $(6, 3)_6$ -граф G , не допускающий гармонической раскраски (следовательно, граф G нераскрашиваем).

3. Элиминация перебора множества неизоморфных $(6, 3)_n$ -графов

3.1. Дерево сокращенного перебора T . Начало построения. Отметим, что граф $G_0 = (X_0, Y_0, E_0)$, сыгравший ключевую роль в доказательстве теоремы 2, был построен нами в результате компьютерных вычислений. Но если происхождение графа G_0 для доказательства теоремы 2, составляющей первую часть утверждения теоремы 1, несущественно, то вторая часть утверждения теоремы 1 всецело получена «компьютерным» путем. В разделе 2 обсуждались трудности перебора $(6, 3)_n$ -графов при $n = 6$; проблема перебора сохраняет остроту и для значения $n = 5$, хотя вычислительные трудности не столь велики, как в случае $n = 6$. Изложим подход, который позволяет существенно сократить перебор.

Отношение изоморфизма разбивает множество M всех $(6, 3)_n$ -графов на классы эквивалентности (классы попарно неизоморфных графов). Если M_0 – подмножество множества M , включающее не менее одного представителя из каждого класса эквивалентности, то проверка существования нераскрашиваемого $(6, 3)_n$ -графа сводится к аналогичной проверке для графов из M_0 .

ЗАМЕЧАНИЕ 3. Сложность построения множества M_0 , включающего из каждого класса эквивалентности точно одного представителя, объясняется трудностью задачи об изоморфизме графов, которая была опубликована в [4] как «открытая» задача, относительно которой неизвестно, является ли она NP -полной. Насколько нам известно, за истекшие четыре десятилетия успех в решении проблемы не достигнут.

Обозначения: $X = \{x_0, x_1, \dots, x_{n-1}\}$, $Y = \{y_0, y_1, \dots, y_{2n-1}\}$;

$X_i = \{x_0, x_1, \dots, x_i\}$, $0 \leq i \leq n-1$; $Y_j = \{y_0, y_1, \dots, y_j\}$, $0 \leq j \leq 2n-1$.

Построение множества M_0 опишем в виде процесса построения корневого дерева T глубины $n-1$, узлы которого представлены графами (в дальнейшем – «узловые графы»):

а) каждый узел V последнего, $(n-1)$ -го уровня представлен некоторым $(6, 3)_n$ -графом $G = G_{n-1}^V$, а множество M_0 определяется как множество всех узловых графов $(n-1)$ -го уровня;

б) каждый узел v уровня $i-1$, принадлежащий пути от корня к вершине последнего уровня V , представлен порожденным на множестве вершин $X_{i-1} \cup Y$ подграфом $G_{i-1}^{(v)}$ графа $G_{n-1}^{(V)}$;

в) в качестве узлового графа для корня дерева T можно без ограничения общности выбрать двудольный граф $G_0 = (X_0, Y, E_0)$, где $E_0 = \{(x_0, y_0), \dots, (x_0, y_5)\}$, поскольку выбор для вершины x_0 любого иного списка смежности приводит к графу, изоморфному G_0 .

3.2. Три правила сокращения узлов в дереве T . С каждым порожденным на множестве вершин $X_i \cup Y$ подграфом $G_i^{(\omega)}$ графа $G_{n-1}^{(V)}$ будем связывать термин «наследник узла v », где v – некоторый узел $(i-1)$ -го уровня. Сформулируем условия, при которых наследник включается в дерево T и, таким образом, становится потомком некоторого узла v (более точно, его непосредственным потомком). Пусть построены все узлы v дерева T до $(i-1)$ -го уровня включительно, $i < n$. Если в

узловым графе $G_{i-1}^{(v)}$ все вершины некоторого подмножества $Y' \subseteq Y$: а) имеют степени меньше 3; б) обладают идентичными списками смежности, то подмножество Y' будем называть *предполем*, а предполе, не являющееся собственным подмножеством никакого другого предполя, будем называть *полем* (узла v). Количество полей рассматриваемого узла v обозначим через N , поля – через $F_1, \dots, F_N$, их мощности – через $l_1, \dots, l_N$, индексы первых элементов полей – через $s_1, \dots, s_N$.

Пример. Для узлового графа G_{i-1}^v , изображенного на рис.3 слева, $N = 4$, $F_1 = \{y_1, y_2\}$, $F_2 = \{y_3, y_4, y_5, y_6\}$, $F_3 = \{y_7, y_8, y_9, y_{10}\}$, $F_4 = \{y_{11}, y_{12}\}$, $l_1 = 2$, $l_2 = 4$, $l_3 = 4$, $l_4 = 2$; $s_1 = 1$, $s_2 = 3$, $s_3 = 7$, $s_4 = 11$.

С точностью до изоморфизма наследник ω узла v определяется количеством a_k вершин списка смежности вершины x_i узлового графа $G_i^{(\omega)} = (X_i, Y, E_\omega)$, принадлежащих полям F_k :

$$a_1 + \dots + a_N = 6, \quad (3.1)$$

$$0 \leq a_k \leq l_k; \quad k = 1, \dots, N. \quad (3.2)$$

Отсюда следует корректность следующего правила.

Правило 1. Из рассмотрения удаляются все наследники ω узла v за исключением тех, для которых список смежности вершины x_i в графе $G_i^{(\omega)}$ содержит точно a_k начальных вершин поля F_k , $k = 1, \dots, N$; таким образом, количество наследников, подлежащих дальнейшему рассмотрению, равно количеству наборов целых чисел, удовлетворяющих системе (3.1)–(3.2).

Рис. 3. Изображены два узла 1-го уровня: v и v' . Поля выделены.

Узловые графы, соответствующие наследникам одного и того же родительского узла, неизоморфны; однако узловые графы наследников разных узлов одного уровня могут оказаться изоморфными. Так, изображенные на рис. 4а и 4б наследники узлов 1-го уровня v и v' , чьи узловые графы изображены на рис.3, изоморфны.

Правило 2. Из наследников ω узла v , удовлетворяющих правилу 1, для дальнейшего рассмотрения выбираются лишь те, у которых список смежности вершины x_i в графе $G_i^{(\omega)}$ имеет не больше общих вершин с Y_5 , чем список смежности вершины x_{i-1}

в узловом графе родительской вершины v . В самом деле, данное правило равносильно требованию упорядочить вершины $x_0, \dots, x_{n-1}$ по принципу невозрастания в их списках смежности количеств вершин, принадлежащих Y_5 .

Рис. 4. Изоморфные наследники узлов v и v' , приведенных на рис.3.

Правило 3. Наследник ω промежуточного уровня i ($i < n - 1$), удовлетворяющий правилам 1-2, включить в дерево T в качестве потомка узла v лишь если в узловом графе $G_i^{(\omega)}$ не менее шести вершин множества Y имеют степени меньше 3; легко видеть, что в противном случае достройка узлового графа $G_i^{(\omega)}$ до $(6, 3)_n$ -графа невозможна.

Для реализации правила 1 используется рекурсивная процедура MakeSplit ($value, k, a, l, s, N$), где a и l – векторы из N целых неотрицательных и целых положительных чисел соответственно, которая по заданным $value, N, l, s$ и k генерирует все разбиения заданного натурального $value$ на слагаемые $a_k + \dots + a_N$, не превышающие соответствующих $l_k, \dots, l_N$.

Процедура MakeSplit ($value, k, a, l, s, N$)

если $k = N$, **то** begin $a_k := value$; Добавление end {о процедуре Добавление см. ниже в п.4.3}

иначе

для j **от** $\max(0, value - (a_{k+1} + \dots + a_N))$ **до** $\min(value, l_k)$ **выполнить**
begin $a_k := j$; MakeSplit ($value - j, k + 1, a, l, s, N$) end;

Конец процедуры

3.3. Построение узлов очередного уровня дерева T . Построение узлов очередного, i -го уровня дерева T выполняется следующим образом. Для графа $G_{i-1}^{(v)}$ каждого узла v уровня $i - 1$ определяется множество полей графа $(N, l_1, \dots, l_N$ и $s_1, \dots, s_N)$, после чего вызовом MakeSplit ($value, 1, a, l, s, N$), где значение фактического параметра $value$ предварительно установлено в значение 6, генерируются разбиения числа 6, удовлетворяющие (3.1)-(3.2); затем для каждого из разбиений процедура Добавление проверяет соблюдение для графа $G_i^{(\omega)}$ правил 1-3 и, в случае их соблюдения, добавляет ω в дерево T в качестве потомка вершины v : количество узлов R в построенной части дерева T увеличивается на единицу, узлу с номером R приписывается граф $G_i^{(\omega)}$, после чего выполняются действия сопроводительного характера: i, N , номер родительского узла v и векторы a, l и s заносятся в соответствующие массивы с позиции R .

Заключение

Предложенный алгоритм элиминации перебора свел задачу к построению дерева из 11645 узлов, из которых 2485 узлов – последнего уровня; узловые графы последнего уровня образуют искомое множество $(6, 3)_6$ -графов M_0 . Программа обнаружила среди них точно 62 нераскрашиваемых графа (включая изображенный на рис.2), а для $n \leq 5$ выяснила раскрашиваемость всех графов из множеств – аналогов M_0 для рассматриваемых n . Тем самым доказано и второе утверждение теоремы 1.

Область практического применения – оптимизация «школьного» расписания. Пусть рассматривается однодневное расписание учебных занятий: X – множество классов, Y – множество учителей, исходные данные к расписанию заданы $(6, 3)$ -графом $G = (X, Y, E)$ – каждому классу запланированы 6 уроков, а каждому учителю – 3 урока. Если цвету $t \in \{1, \dots, 6\}$ каждого ребра $(x_i, y_j) \in E$ соотнести номер академического часа – занятия j -го учителя в i -м классе, то задача о раскрашиваемости графа G преобразуется в задачу о существовании расписания длительности 6 без «окон» у учителей и классов.

Список литературы

- [1] Свами М., Тхуласираман К. Графы, сети и алгоритмы. М.: Мир. 1984. 455 с.
- [2] Casselgren C.J. On Some Graph Coloring Problems // Doctoral Thesis No. 48. Department of Mathematics and Mathematical Statistics Umea University. 2011.
- [3] Магомедов А.М. К вопросу об условиях уплотнимости матрицы из 6 столбцов // Деп. в ВИНТИ. 1991.
- [4] Karp R.M. Reducibility among combinatorial problems // in R.E. Miller and J.W. Thatcher (eds.). Complexity of Computer Computations. Plenum Press. New York. 1972. P. 85–103.

А. М. Магомедов (A. M. Magomedov)

Дагестанский научный центр РАН

E-mail: magomedtagirl@yandex.ru

Поступила в редакцию

20.11.2013